

## LISTE DES LICHENS OBSERVÉS ET/OU RÉCOLTÉS LORS DE L'EXCURSION DE L'A.F.L. EN CORSE (13-20 avril 1999)

Guilloux Françoise<sup>1</sup>, Bellemère André<sup>2</sup>, Gueidan Cécile<sup>3</sup>

<sup>1</sup> 25 bis, rue de Montmorency  
95410 Groslay

<sup>2</sup> 53, Jardins Boieldieu  
92800 Puteaux

<sup>3</sup> 96, rue Pierre Loti  
92130 Issy les Moulineaux

Les références (Bell.), (Guei.) et (Guil.) précisent la localisation des échantillons d'herbier respectivement chez André Bellemère, Cécile Gueidan et Françoise Guilloux.

### • Jeudi 15 avril 1999

#### 1 AM-A : Pointe de la Parata

La pointe de la Parata se situe sur la route côtière qui se dirige vers les îles sanguinaires, à l'ouest d'Ajaccio. Au niveau géologique, les roches sont des diorites qui forment un alignement N.E. – S.W. long de 6km se poursuivant dans les îles sanguinaires. La pointe comprend dans sa partie est des terrains quaternaires marins. Ces nombreux affleurements ont individuellement une surface réduite. Ce sont principalement des grès à fragments biodétritiques (i.e. avec des fragments d'animaux fossilisés tels que des gastéropodes ou des fragments d'oursins), ainsi que des conglomérats.

*Anaptychia runcinata*  
(= *Heterodermia runcinata*)  
*Aspicilia* sp. (Bell.)  
*B. cerussata*  
*Buellia chlorophaea*  
*Buellia spuria*  
*Caloplaca aractina*  
*Caloplaca crenularia* (= *C. festiva*)  
*Caloplaca ora* (voisin de *C. marina*)  
*Diploicia subcanescens*  
*Diploschistes actinostomus*

*Parmelia pulla*  
*Pertusaria* cf. *pertusa* (Bell.)  
*Pertusaria pluripuncta* (= *P. gallica*)  
*Pertusaria rupestris*  
*Pertusaria* sp. (Guil.)  
*Pertusaria* sp. (Bell.)  
*Protoparmelia badia*  
*Ramalina breviscula*  
*Ramalina implectens*

Bull. Inform. Ass. Fr. Lichénologie - 2000 - 25(2)

|                                                                     |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <i>Dirina massiliensis</i> f. <i>massiliensis</i>                   | <i>Rocella phycopsis</i>                        |
| <i>Dirina massiliensis</i> f. <i>sorediata</i>                      | <i>Rocella tuberculata</i>                      |
| <i>Dirina massiliensis</i> var. <i>patronii</i>                     | <i>Rocella vicentina</i>                        |
| <i>Fuscidea</i> sp. ? (Bell.)                                       | <i>Xanthoria parietina</i> v. <i>calicicola</i> |
| <i>Lecanora gangaleoides</i>                                        | <i>Xanthoria resendei</i>                       |
| <i>Lecanora schistina</i>                                           | <i>Xanthoria resendei</i> ? (Bell.)             |
| <i>Lecanora sulphurea</i>                                           |                                                 |
| <i>Lecidella subincongrua</i> var. <i>elaeochromoides</i>           |                                                 |
| <i>Lecidella subincongrua</i> var. <i>elaeochromoides</i> ? (Bell.) |                                                 |

## 1 PM-B : Landes de Campo dell'Oro

Site sableux localisé au bord de la mer à la sortie de l'aéroport.

|                                                            |                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <i>Amandinea punctata</i>                                  | <i>Parmelia somloensis</i>                     |
| <i>Cetraria aculeata</i> (= <i>Coelocaulon aculeatum</i> ) | <i>Parmelia soredians</i>                      |
| <i>Cladonia cervicornis</i>                                | <i>Parmelia subaurifera</i>                    |
| <i>Cladonia firma</i> (= <i>C. nylanderii</i> )            | <i>Parmelia subrudecta</i>                     |
| <i>Cladonia foliacea</i> v. <i>foliacea</i>                | <i>Parmelia tiliacea</i>                       |
| <i>Cladonia furcata</i>                                    | <i>Patellariaceae</i> ? (Bell.)                |
| <i>Cladonia humilis</i>                                    | <i>Pertusaria amara</i>                        |
| <i>Cladonia mediterranea</i>                               | <i>Physcia adscendens</i>                      |
| <i>Cladonia rangiformis</i>                                | <i>Pseudevernia furfuracea</i>                 |
| <i>Cladonia subrangiformis</i>                             | <i>Ramalina canariensis</i>                    |
| <i>Diploicia canescens</i>                                 | <i>Ramalina farinacea</i>                      |
| <i>Evernia prunastri</i> v. <i>arenaria</i>                | <i>Ramalina fastigiata</i>                     |
| <i>Evernia prunastri</i> v. <i>prunastri</i>               | <i>Ramalina implectens</i>                     |
| <i>Lecanora lividocinerea</i>                              | <i>Ramalina panizzei</i>                       |
| <i>Lecidella elaeochroma</i>                               | <i>Ramalina pusilla</i>                        |
| <i>Parmelia borrieri</i> ? (Guei.)                         | <i>Xanthoria parietina</i> v. <i>parietina</i> |
| <i>Parmelia caperata</i>                                   | ? apothécie lécidéine noire (Bell.)            |
| <i>Parmelia perlata</i>                                    |                                                |

- 
- **Vendredi 16 avril 1999**

## 2 AM-C : Ermitage de la Trinité

L'ermitage de la trinité se situe à l'ouest de Bonifacio. Le substrat est un granite leucocrate à quartz automorphe et feldspaths rose vif. L'essentiel de la végétation est composée d'arbustes et d'arbrisseaux comme *Cistus monspeliensis*, *Myrtus communis* ssp. *communis*, *Erica arborea*, *Calicotome villosa*, *Arbutus unedo*, *Phillyrea angustifolia*, *Cistus salvifolius*, *Cistus incanus* ssp. *corsicus*, *Genista corsica* et *Ruscus aculeatus*

|                                                                |                                                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <i>Anaptychia runcinata</i> (= <i>Heterodermia runcinata</i> ) | <i>Pertusaria rupicola</i>                     |
| <i>Aspicilia caesiocinerea</i>                                 | <i>Physcia aipolia</i>                         |
| <i>Buellia saxorum</i>                                         | <i>Physcia adscendens</i>                      |
| <i>Caloplaca aegatica</i>                                      | <i>Physconia distorta</i>                      |
| <i>Caloplaca crenularia</i> (= <i>C. festiva</i> )             | <i>Physconia distorta</i> v. <i>subvenusta</i> |

Bull. Inform. Ass. Fr. Lichénologie – 2000 – 25(2)

*Caloplaca* sp. (Bell.)  
*Collema flaccidum* (fertile)  
*Fuscidea cyathoides*  
*Lassalia brisantium*  
*Lassalia pustulata*  
*Lecanora lividocinerea*  
*Lecanora muralis*  
*Ochrolechia parella*  
*Opegrapha* sp. (Bell.)  
*Parmelia caperata*  
*Parmelia conspersa* ssp. *conspersa*  
*Parmelia conspersa* ssp. *tinctina*  
*Parmelia loxodes*  
*Parmelia perlata*  
*Parmelia pulla*  
*Parmelia reticulata*  
*Parmelia saxatilis*  
*Parmelia somloensis*  
*Parmelia soredians*  
*Parmelia stygia* v. *septentrionalis*  
*Parmelia tiliacea*  
*Parmelia tinctina*  
*Pertusaria mammosa*  
*Pertusaria pluripuncta* (= *P. gallica*)

*Pyreno lirelliforme* ? (Bell.)  
*Pyrrhospora quernei*  
*Ramalina breviuscula* ? (Guil.)  
*Ramalina canariensis*  
*Ramalina fraxinea*  
*Ramalina lusitanica*  
*Ramalina lusitanica* ? (Guil.)  
*Ramalina pollinaria*  
*Ramalina polymorpha*  
*Ramalina pusilla*  
*Ramalina requienii*  
*Ramalina subfarinacea*  
*Ramalina* sp. *saxicole* (Bell.)  
*Rhizocarpon geographicum*  
*Rocella arnoldii*  
*Rocella fuciformis*  
*Rocella phycopsis*  
*Rocella tuberculata*  
*Schismatomma albocincta* (= *S. pitardi*)  
*Schismatomma decolorans*  
*Xanthoria parietina* v. *calcicola*  
*Xanthoria parietina* v. *parietina*  
*Xanthoria elegans*

## 2 PM-D : Bonifacio, Pertusato

*Arthonia meridionalis*  
*Bacidia rubella*  
*Bactrospora patellarioides* (= *Lecanactis patellarioides*)  
*Caloplaca flavescens* (= *C. heppiana*)  
*Caloplaca navasiana*  
*Caloplaca polycarpa* (= *C. tenuatula*)  
*Caloplaca subochracea* v. *subochracea*  
*Caloplaca tenuatula* v. *athallina*  
*Caloplaca* sp. (Guil.)  
*Caloplaca* sp. (Guil.)  
*Diploicia canescens*  
*Dirina ceratoniae*

*Lecanora bandolensis*  
*Opegrapha calcarea*  
*Opegrapha durieui*  
*Opegrapha grumulosa*  
*Opegrapha* sp. (Guil.)  
*Opegrapha* sp. (Bell.)  
*Ramalina canariensis*  
*Solenopsora olivacea*  
*Verrucaria calciseda*  
*Verrucaria macrostoma* (forme isidiée)  
*Verrucaria nigrescens*

### • Samedi 17 avril 1999

## 3 AM-E1 : à 6 km du col de Vizzavona (alt = 1100 m)

*Caloplaca* sp. (Guil.)  
 (Guil.)

*Lobaria amplissima*  
*Lobaria pulmonaria*  
*Parmelia contorta* (= *P. submontana*)

*Peltigera polydactyla* ou du groupe

*Peltigera praetextata*  
*Physcia aipolia*  
*Physconia venusta*

## 3 AM-E2 : Gorges du Prunelli, commune de Bastelica (alt = 600 m)

Bull. Inform. Ass. Fr. Lichénologie – 2000 – 25(2)

*Cladonia foliacea*  
*Cladonia furcata*  
*Cladonia ramulosa*  
*Cladonia rangiformis*  
*Cladonia symphicarpa*  
*Collema* sp. (petit *Collema* en coussinet) (Guil.)  
*Evernia prunastri*  
*Hypogymnia tubulosa*  
*Lasallia pustulata*  
*Lecidea fuscoatra* v. *grisella*  
*Lobaria pulmonaria*  
*Lobaria scrobiculata*

*Parmelia contorta* (= *P. submontana*)  
*Parmelia exasperata*  
*Parmelia perlata*  
*Parmelia saxatilis*  
*Parmelia somloensis*  
*Pertusaria albescens*  
*Pertusaria excludens*  
*Phlyctis argena*  
*Pseudevernia furfuracea*  
*Rhizocarpon geographicum*  
*Rhizocarpon viridiatrum*  
*Umbilicaria crustulosa*

**PM : Col de Mercujo, vers le village de Tolla (alt = 700 m) (3 PM-E3)**

*Chrysothrix candelaris*  
*Cladonia cervicornis* v. *cervicornis*  
*Cladonia coniocraea*  
*Cladonia furcata*  
*Collema* sp. 1 (Guil.)  
*Collema* sp. 2 (Guil.)  
*Enterographa zonata* (= *Opegrapha zonata*)  
*Lecidea confluenta*  
*Lobaria amplissima*  
*Lobaria pulmonaria*  
*Lobaria scrobiculata*  
*Lobaria* sp. (Bell.)  
*Nephroma laevigatum*  
*Normandina pulchella*  
*Ochrolechia androgyna*  
*Ochrolechia subviridis*  
*Ochrolechia* sp. (Bell.)  
*Pachyphiale cornea*  
*Pannaria conoplea*  
*Parmelia caperata*  
*Parmelia pulla*  
*Parmelia quercina*  
*Parmelia saxatilis*

*Parmelia somloensis*  
*Parmelia sulcata*  
*Parmelia tiliacea*  
*Parmeliella plumbea*  
*Peltigera collina*  
*Peltigera praetextata*  
*Peltigera* cf (Bell.)  
*Pertusaria albescens*  
*Pertusaria amara*  
*Pertusaria coccodes*  
*Pertusaria excludens*  
*Pertusaria* sp. (Guil.)  
*Phlyctis argena*  
*Physconia venusta*  
*Porpidia cinereoatra*  
*Porpidia crustulata*  
*Porpidia* cf.1 (Bell.)  
*Porpidia* cf.2 (Bell.)  
*Porpidia* cf.3 (Bell.)  
*Pyrrospora quereana*  
*Umbilicaria cylindrica*  
*Xanthoria parietina* v. *calcicola*

+ champignon parasite de *Lobaria pulmonaria*  
*Plectocarpon lichenum* (= *Lichenomyces lichenum*)

•

• **Dimanche 18 avril 1999**

**4 AM-F1 : Pietrosella, Forêt domaniale de Chiavari, ruisseau de Zirione, principalement sur chênes lièges (alt = 20-50 m)**

*Amandinea punctata*  
*Bacidia rubella*  
*Bactrospora patellarioides* (= *Lecanactis patellarioides*)  
*Bactrospora patellarioides* (= *Lecanactis patellarioides*) ? (Guil.)  
*Parmelia saxatilis*  
*Parmelia soledians*  
*Parmelia subaurifera*  
*Parmelia subrudecta*

Bull. Inform. Ass. Fr. Lichénologie – 2000 – 25(2)

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <i>Chrysothrix candelaris</i>           | <i>Parmelia sulcata</i>                   |
| <i>Cladonia fimbriata</i>               | <i>Parmelia tiliacea</i>                  |
| <i>Cladonia foliacea</i>                | <i>Parmelia</i> sp. (Guil.)               |
| <i>Cladonia furcata</i>                 | <i>Pertusaria albescens</i>               |
| <i>Cladonia mediterranea</i>            | <i>Pertusaria amara</i>                   |
| <i>Cladonia pyxidata</i>                | <i>Pertusaria hemisphaerica</i>           |
| <i>Cladonia rangiformis</i>             | <i>Pertusaria hemisphaerica</i> ? (Guil.) |
| <i>Collema rysssoleum</i>               | <i>Pertusaria leioplaca</i>               |
| <i>Evernia prunastri</i>                | <i>Pertusaria</i> sp. (Guil.)             |
| <i>Heterodermia obscurata</i>           | <i>Phlyctis agelaea</i>                   |
| <i>Hypogymnia physodes</i>              | <i>Phlyctis argena</i>                    |
| <i>Hypogymnia tubulosa</i>              | <i>Physcia adscendens</i>                 |
| <i>Lecanora chlarotera</i>              | <i>Pyrrhospora quernea</i>                |
| <i>Lecanora lividocinerea</i>           | <i>Ramalina calicaris</i>                 |
| <i>Lecanora</i> sp. (Guil.)             | <i>Ramalina farinacea</i>                 |
| <i>Lecidella elaeochroma</i>            | <i>Ramalina fastigiata</i>                |
| <i>Lobaria pulmonaria</i> (sur olivier) | <i>Ramalina fastigiata</i> ? (Guil.)      |
| <i>Normandina pulchella</i>             | <i>Ramalina implectens</i>                |
| <i>Ochrolechia pallescens</i>           | <i>Ramalina pusilla</i>                   |
| <i>Opegrapha corticola</i>              | <i>Ramalina subfarinacea</i> ? (Guil.)    |
| <i>Pannaria mediterranea</i>            | <i>Ramalina</i> sp. (Guil.)               |
| <i>Parmelia caperata</i>                | <i>Schismatomma decolorans</i>            |
| <i>Parmelia hypoleucina</i>             | <i>Schismatomma graphioides</i>           |
|                                         | (= <i>Opegrapha rufescens</i> )           |
| <i>Parmelia perlata</i>                 | <i>Tephromela atra</i> ? (Guil.)          |
| <i>Parmelia quercina</i>                | <i>Usnea</i> sp. (Guil.)                  |
| <i>Parmelia reticulata</i>              |                                           |

#### 4 AM-F2 : Pietrosella, Forêt domaniale de Chiavari, dans le "maquis" corse

|                                                    |                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <i>Caloplaca ferruginea</i>                        | <i>Parmelia conspersa</i> ssp. <i>conspersa</i> |
| <i>Cladonia cervicornis</i> v. <i>cervicornis</i>  | <i>Parmelia pulla</i>                           |
| <i>Cladonia cervicornis</i> v. <i>verticillata</i> | <i>Parmelia quercina</i>                        |
| <i>Cladonia foliacea</i>                           | <i>Parmelia subaurifera</i>                     |
| <i>Cladonia mediterranea</i>                       | <i>Physcia aipolia</i>                          |
| <i>Cladonia rangiformis</i>                        | <i>Physconia distorta</i>                       |
| <i>Cladonia symphicarpa</i>                        | <i>Platismatia glauca</i>                       |
| <i>Fuscidea cyathoides</i> (saxicole)              | <i>Ramalina canariensis</i>                     |
| <i>Heterodermia obscurata</i>                      | <i>Rinodina</i> cf. <i>exigua</i> (Guil.)       |
| <i>Hypogymnia physodes</i>                         | <i>Xanthoria parietina</i> v. <i>parietina</i>  |
| <i>Hypogymnia tubulosa</i>                         |                                                 |

#### 4 AM-F3 : Pietrosella, Forêt domaniale de Chiavari, plage des paillottes, sur rochers au bout de la plage

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Caloplaca chalybaea</i>   | <i>Pertusaria mammosa</i>         |
| <i>Lecanora albescens</i>    | <i>Pertusaria rupicola</i>        |
| <i>Lecanora gangaleoides</i> | <i>Solenospora vulturienensis</i> |

Bull. Inform. Ass. Fr. Lichénologie – 2000 – 25(2)

*Pertusaria stérile, parasité soit par Melaspilea canariensis, soit par Buellia parasite* (Guil.)

*Tephromela atra*  
*Toninia sp.* (Guil.)

#### 4 PM-G : Coti-Chiavari, forêt domaniale de Chiavari, Col de Cortonu (alt = 523 m)

*Anaptychia runcinata* (= *Heterodermia runcinata*)

*Aspicilia caesiocinerea*

*Candelariella vitellina*

*Chrysothrix candelaris*

*Cladonia cervicornis* v. *cervicornis*

*Cladonia cervicornis* v. *verticillata*

*Cladonia firma* (= *C. nylanderii*)

*Cladonia foliacea*

*Cladonia humilis* (= *C. conoidea*)

*Cladonia mediterranea*

*Cladonia rangiformis*

*Cladonia subcervicornis*

(Guil.)

*Cladonia subulata*

*Diploschistes scruposus*

*Evernia prunastri*

*Haematomma ochroleucum*

*Heterodermia obscurata*

*Hypogymnia farinacea* (= *H. bitteriana*)

*Hypogymnia physodes*

*Lasallia pustulata*

*Lecanora muralis* ssp. *bolcana* (= *L. bolcana*)

*Lecanora rupicola* v. *sulphurata*

*Lecidea fuscoatra* v. *grisella*

*Lethariella divaricata* ?

*Lethariella intricata* ?

*Miriquidica deusta*

*Nephroma laevigatum*

*Ochrolechia pallescens*

*Ochrolechia parella*

*Ochrolechia tartarea* (= *O. crozalsiana*)

*Ochrolechia sp.* (Guil.)

*Ochrolechia sp. sorédié* (Guil.)

*Parmelia conspersa* ssp. *conspersa*

*Parmelia crinita* (*P. ciliata* ?) (Bell.)

*Parmelia glabratula* ssp. *fuliginosa*

*Parmelia glabratula* ssp. *glabratula*

*Parmelia perlata*

*Parmelia pulla*

*Parmelia saxatilis*

*Peltigera horizontalis*

*Peltigera neopolydactyla*

*Peltigera rufescens*

*Pertusaria albescens*

*Pertusaria corallina*

*Pertusaria excludens*

*Pertusaria mammosa*

*Pertusaria pseudocorallina*

(= *P. microsticta*)

*Pertusaria rupicola*

*Pertusaria sp.1* K+ jaune vif

*Pertusaria sp.2* K+ rouge (Guil.)

*Pertusaria sp.1* (Bell.)

*Pertusaria sp.2* (Bell.)

*Phycia sp.* (Guil.)

*Porpidia cinereoatra*

*Porpidia tuberculosa*

*Ramalina calicaris*

*Ramalina cf. clementeana* (Guil.)

*Ramalina farinacea*

*Ramalina polymorpha*

*Ramalina subfarinacea*

*Ramalina requienii*

*Ramalina sp.* (Bell.)

*Rhizocarpon geographicum*

*Rinodina sp.* (Guil.)

*Rocella phycopsis*

*Teloschistes chrysophthalmus*

*Tephromela aglaea*

(= *Lecidea aglaea*)

*Tephromela aglaea* ? (Bell.)

*Tephromela atra*

*Umbilicaria crustulosa*

*Umbilicaria crustulosa* ? (Guei.)

*Umbilicaria polyrrhiza*

*Usnea sp.* (Guil.)

*Xanthoria parietina* v. *calicicola*

• Lundi 19 avril 1999

**5 AM-H : forêt d'Aitone, foyer de ski de fond, platière et rochers**

La forêt d'Aitone débute au dessus d'Evisa et court jusqu'au col de Vergio à 1477 m d'altitude. Elle fait pendant à celle de Valdo Niello située de l'autre côté du col. C'est une forêt de châtaigniers, de pins laricio et de hêtres. Elle est traversée par une route forestière datant du second Empire édifée pour l'acheminement des fûts de pins.

|                                                                    |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <i>Anaptychia runcinata</i> (= <i>Heterodermia runcinata</i> )     | <i>Parmelia glabratula</i> ssp.                                      |
| <i>fuliginosa</i>                                                  |                                                                      |
| <i>Aspicilia caesiocinerea</i>                                     | <i>Parmelia omphalodes</i>                                           |
| <i>Bryoria fuscescens</i>                                          | <i>Parmelia pulla</i>                                                |
| <i>Buellia</i> cf. <i>saxorum</i> ? (Guil.)                        | <i>Parmelia saxatilis</i>                                            |
| <i>Candelariella vitellina</i>                                     | <i>Parmelia somloensis</i>                                           |
| <i>Candelariella</i> sp. (Bell.)                                   | <i>Parmelia stygia</i>                                               |
| <i>Cetraria acuelata</i>                                           | <i>Parmelia stygia</i> v. <i>septentrionalis</i>                     |
| <i>Cetraria chlorophylla</i>                                       | <i>Parmelia sulcata</i>                                              |
| <i>Cladonia coccifera</i>                                          | <i>Pertusaria amara</i>                                              |
| <i>Cladonia coniocraea</i>                                         | <i>Pertusaria corallina</i>                                          |
| <i>Cladonia digitata</i>                                           | <i>Pertusaria excludens</i>                                          |
| <i>Cladonia fimbriata</i>                                          | <i>Pertusaria mammosa</i>                                            |
| <i>Cladonia furcata</i>                                            | <i>Pertusaria</i> cf. <i>pertusa</i> (Guil.)                         |
| <i>Cladonia pseudopytirea</i>                                      | <i>Pertusaria pseudocorallina</i><br>(= <i>P. microsticta</i> )      |
|                                                                    | <i>Pertusaria rupicola</i>                                           |
| <i>Cladonia subulata</i>                                           | <i>Pertusaria subcorallina</i>                                       |
| <i>Cornicularia normoerica</i>                                     | <i>Physcia caesia</i>                                                |
| <i>Dimelaena oreina</i>                                            | <i>Platismatia glauca</i>                                            |
| <i>Fuscidea cyathoides</i>                                         | <i>Pseudevernia furfuracea</i>                                       |
| <i>Fuscidea kochiana</i> (= <i>Lecidea kochiana</i> )              | <i>Psilolechia lucida</i>                                            |
| <i>Haematomma ochroleucum</i>                                      | <i>Ramalina polymorpha</i> ? (Guil.)                                 |
| <i>Hypogymnia farinacea</i> (= <i>H. biterriana</i> )              | <i>Ramalina subfarinacea</i>                                         |
| <i>Hypogymnia physodes</i>                                         | <i>Ramalina</i> sp. (Bell.)                                          |
| <i>Hypogymnia tubulosa</i>                                         | <i>Ramalina</i> sp. (Guil.)                                          |
| <i>Lasallia pustulata</i>                                          | <i>Rhizocarpon geographicum</i>                                      |
| <i>Lecanora laatokkaensis</i>                                      | <i>Rhizocarpon viridiatrum</i>                                       |
| <i>Lecanora muralis</i> ssp. <i>bolcana</i> (= <i>L. bolcana</i> ) | <i>Schaereria fuscocinerea</i><br>(= <i>S. tenebrosa</i> ) ? (Guil.) |
| <i>Lecanora muralis</i> v. <i>muralis</i>                          | <i>Sphaerophorus globosus</i>                                        |
|                                                                    | <i>Umbilicaria crustulosa</i>                                        |
| <i>Lecanora subcarnea</i>                                          | <i>Umbilicaria crustulosa</i> ? (Guei.)                              |
| <i>Lecanora</i> cf. <i>venskei</i> (Bell.)                         | <i>Umbilicaria cylindrica</i>                                        |
| <i>Lecidea confluens</i>                                           | <i>Umbilicaria hirsuta</i> ? (Guei.)                                 |
| <i>Leproloma membranacea</i>                                       | <i>Umbilicaria polyphylla</i>                                        |
| <i>Lethariella divaricata</i>                                      | <i>Umbilicaria polyrrhiza</i>                                        |
| <i>Lethariella intricata</i> ? (Guei.)                             | <i>Umbilicaria</i> sp. 1 (Guil.)                                     |
| <i>Ochrolechia</i> sp. <i>corsicana</i> ? (Bell.)                  | <i>Umbilicaria</i> sp. 2 (Guil.)                                     |
| <i>Ochrolechia corsicana</i> (sorédié) ? (Guil.)                   |                                                                      |
| <i>Ochrolechia tartarea</i> (= <i>O. crozalsiana</i> )             |                                                                      |

**5 PM-I : forêt d'Aitone, à quelques centaines de mètres du village de vacances, dans la hêtraie-sapinière (alt = 1100-1200 m)**

|                                                       |                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <i>Alectoria</i> sp. (Bell.)                          | <i>Lobaria pulmonaria</i>                   |
| <i>Anaptychia ciliaris</i>                            | <i>Nephroma laevigatum</i>                  |
| <i>Bacidia</i> ??? (Guil.)                            | <i>Parmelia laciniatula</i>                 |
| <i>Bryoria fuscescens</i>                             | <i>Parmelia saxatilis</i>                   |
| <i>Cetraria chlorophylla</i>                          | <i>Parmelia submontana</i>                  |
| <i>Cetrelia olivetorum</i>                            | <i>Parmelia sulcata</i>                     |
| <i>Cladonia</i> gr. <i>chlorophaea</i> (Guil.)        | <i>Parmelia</i> sp. (Guil.)                 |
| <i>Cladonia</i> gr. <i>coccifera</i> (Guil.)          | <i>Parmeliella plumbea</i>                  |
| <i>Cladonia ochrochlora</i>                           | <i>Peltigera horizontalis</i>               |
| <i>Cladonia polydactyla</i>                           | <i>Pertusaria amara</i>                     |
| <i>Cladonia</i> sp. (Bell.)                           | <i>Pertusaria hemisphaerica</i> ? (Guil.)   |
| <i>Evernia divaricata</i>                             | <i>Pertusaria pertusa</i> ? (Guil.)         |
| <i>Evernia illyrica</i>                               | <i>Physconia distorta</i>                   |
| <i>Evernia prunastri</i>                              | <i>Physconia venusta</i>                    |
| <i>Fuscidea cyathoides</i> (corticole)                | <i>Platismatia glauca</i>                   |
| <i>Hypogymnia farinacea</i> (= <i>H. bitteriana</i> ) | <i>Porpidia cinereoatra</i>                 |
| <i>Hypogymnia physodes</i>                            | <i>Porpidia glaucophaea</i> ? (Guil.)       |
| <i>Hypogymnia tubulosa</i>                            | <i>Porpidia</i> sp. (Bell.)                 |
| <i>Lecanactis abietina</i>                            | <i>Pseudevernia furfuracea</i>              |
| <i>Lecanora</i> gr. <i>argentata</i> (Guil.)          | <i>Ramalina farinacea</i>                   |
| <i>Lecanora glabrata</i>                              | <i>Thelotrema lepadinum</i>                 |
| <i>Lecanora</i> gr. <i>piniperda</i> (Guil.)          | <i>Usnea</i> cf. <i>articulata</i> (Guil.)  |
| <i>Lecanora subrugosa</i> ? (Guil.)                   | <i>Usnea</i> cf. <i>articulata</i> (Bell.)  |
| <i>Letharia divaricata</i> ? (Guei.)                  | <i>Usnea</i> cf. <i>filipendula</i> (Bell.) |
| <i>Lobaria amplissima</i>                             | <i>Usnea florida</i>                        |

• **Mardi 20 avril 1999****5 AM-J : Col de Vizzavona, cascade des anglais (alt = 1100 m)**

Au niveau géologique, la zone de Vizzavone se situe sur des terrains issus de l'histoire glacière. Le col est entaillé dans une moraine d'un paléoglacier du Vecchio. Un peu plus loin du parking forestier de la hêtraie, il est possible d'observer du gneiss à biotite.

La forêt de Vizzavone est composée principalement de pins laricio et de hêtres. Le pin laricio est un arbre emblématique de la Corse. Sa hauteur peut atteindre 50m et son diamètre 2m. Il couvre près de 20 000 ha en Corse avec un optimum entre 900 et 1200m d'altitude.

|                                                         |                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <i>Anaptychia ciliaris</i>                              | <i>Parmelia quercina</i>                         |
| <i>Buellia</i> gr. <i>saxorum</i> (Guil.)               | <i>Parmelia saxatilis</i>                        |
| <i>Candelariella vitellina</i>                          | <i>Parmelia somloensis</i>                       |
| <i>Cladonia coccifera</i>                               | <i>Parmelia submontana</i>                       |
| <i>Cladonia foliacea</i>                                | <i>Peltigera collina</i>                         |
| <i>Cladonia pyxidata</i>                                | <i>Peltigera horizontalis</i>                    |
| <i>Cladonia rangiformis</i>                             | <i>Peltigera</i> cf. <i>horizontalis</i> (Bell.) |
| <i>Cladonia symphicarpa</i>                             | <i>Peltigera membranacea</i>                     |
| <i>Dermatocarpon weberi</i>                             | <i>Peltigera praetextata</i>                     |
| <i>Diploschistes bisporus</i>                           | <i>Pertusaria albescens</i>                      |
| <i>Diploschistes scruposus</i>                          | <i>Pertusaria excludens</i>                      |
| <i>Enterographa zonata</i> (= <i>Opegrapha zonata</i> ) | <i>Pertusaria hymenea</i>                        |

*Enterographa zonata* (= *Opegrapha zonata*)  
*Fuscidea cyathoides* (corticole)

*Fuscidea mollis* ? sorédié (Guil.)

*Fuscidea* sp. (Bell.)

*Graphis* cf. (*pyncnides*?) (Bell.)

*Immersaria athroocarpa* (= *Amygdalaria athroocarpa*)

*Lecanora cenisia*

*Lecanora cenisia* v. *atrynea*

*Lecanora intricata*

*Lecanora muralis*

*Lecanora polytropa*

*Lecanora rupicola* v. *sulphurata*

*Lecanora subcarnea*

*Lecanora sulphurea*

*Lecidea fuscoatra*

*Lecidea* gr. *lactea* (Guil.)

*Lecidella carpathica*

*Lepraria incana*

*Lobaria amplissima*

*Lobaria pulmonaria*

*Lobaria scrobiculata*

*Nephroma laevigatum*

*Parmelia elegantula*

*Parmelia laciniatula*

*Pertusaria hymenea*

*Pertusaria pseudocorallina*

(= *P. microsticta*) ? (Guil.)

*Pertusaria rupicola*

*Pertusaria* sp. (Guil.)

*Physconia distorta*

*Physconia venusta*

*Platismatia glauca*

*Porpidia glaucophaea* ? (Guil.)

*Porpidia tuberculosa* ? (Guil.)

*Protoparmelia badia*

*Pseudevernia furfuracea*

*Psilolechia lucida*

*Ramalina farinacea*

*Ramalina fastigiata* ? (Guei.)

*Ramalina fastigiata/vizzavonensis* ? (Guil.)

*Ramalina* sp. (Guil.)

*Rimularia insularis*

(= *Lecidea insularis*)

*Rhizocarpon geographicum*

*Schaereria fuscocinerea* (= *S. tenebrosa*) ? (Guil.)

*Sporastatia polyspora*

(= *S. cinerea*)

*Stereocaulon botryosum* ? (Guei.)

*Stereocaulon evolutum*

*Umbilicaria crustulosa* ? (Guei.)

Tableau récapitulatif des taxons observés et/ou récoltés

| Espèces                                     | Références | Stations                                                  |
|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| <i>Alectoria</i> sp. (Bell.)                | 5 PM-I     | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière – Alt. 1100-1200 m      |
| <i>Amandinea punctata</i>                   | 1 PM-B     | Landes de Campo dell'Oro près d'Ajaccio                   |
| <i>Amandinea punctata</i>                   | 4 AM-F1    | Forêt de Chiavari – Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| <i>Anaptychia ciliaris</i>                  | 3 AM-E2    | Gorges du Prunelli – Alt. 600 m                           |
| <i>Anaptychia ciliaris</i>                  | 5 PM-I     | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière – Alt. 1100-1200 m      |
| <i>Anaptychia ciliaris</i>                  | 6 AM-J     | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| <i>Anaptychia runcinata</i>                 | 1 AM-A     | Pointe de la Parata                                       |
| <i>Anaptychia runcinata</i>                 | 2 AM-C     | Ermitage de la Trinité                                    |
| <i>Anaptychia runcinata</i>                 | 4 PM-G     | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| <i>Anaptychia runcinata</i>                 | 5 AM-H     | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| <i>Arthonia meridionalis</i>                | 2 PM-D     | Bonifacio – Pertusato                                     |
| <i>Aspicilia caesiocinerea</i>              | 4 PM-G     | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| <i>Aspicilia caesiocinerea</i>              | 5 AM-H     | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| <i>Aspicilia caesiocinerea</i>              | 2 AM-C     | Ermitage de la Trinité                                    |
| <i>Aspicilia</i> sp. (Bell.)                | 1 AM-A     | Pointe de la Parata                                       |
| <i>Bacidia</i> ? (Guil.)                    | 5 PM-I     | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière – Alt. 1100-1200 m      |
| <i>Bacidia rubella</i>                      | 2 PM-D     | Bonifacio – Pertusato                                     |
| <i>Bacidia rubella</i>                      | 4 AM-F1    | Forêt de Chiavari – Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| <i>Bactrospora patellarioides</i>           | 2 PM-D     | Bonifacio – Pertusato                                     |
| <i>Bactrospora patellarioides</i>           | 4 AM-F1    | Forêt de Chiavari – Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| <i>Bactrospora patellarioides</i> ? (Guil.) | 4 AM-F1    | Forêt de Chiavari – Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |

|                                         |         |                                                           |
|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| Bryoria fuscescens                      | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| Bryoria fuscescens                      | 5 PM-I  | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière – Alt. 1100-1200 m      |
| Buellia cerussata                       | 1 AM-A  | Pointe de la Parata                                       |
| Buellia chlorophaea                     | 1 AM-A  | Pointe de la Parata                                       |
| Buellia saxorum                         | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Buellia cf. saxorum ? (Guil.)           | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| Buellia gr. Saxorum (Guil.)             | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| Buellia spuria                          | 1 AM-A  | Pointe de la Parata                                       |
| Caloplaca aegatica                      | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Caloplaca aractina                      | 1 AM-A  | Pointe de la Parata                                       |
| Caloplaca chalybaea                     | 4 AM-F3 | Plage des pailotes, sur les rochers                       |
| Caloplaca crenularia                    | 1 AM-A  | Pointe de la Parata                                       |
| Caloplaca crenularia                    | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Caloplaca ferruginea                    | 4 AM-F2 | Dans le "maquis corse"                                    |
| Caloplaca flavesces                     | 2 PM-D  | Bonifacio – Pertusato                                     |
| Caloplaca navasiana                     | 2 PM-D  | Bonifacio – Pertusato                                     |
| Caloplaca ora                           | 1 AM-A  | Pointe de la Parata                                       |
| Caloplaca polycarpa                     | 2 PM-D  | Bonifacio – Pertusato                                     |
| Caloplaca subochracea v. subochracea    | 2 PM-D  | Bonifacio – Pertusato                                     |
| Caloplaca tenuatula v. athallina        | 2 PM-D  | Bonifacio – Pertusato                                     |
| Caloplaca sp. (Bell.)                   | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Caloplaca sp. (Guil.)                   | 2 PM-D  | Bonifacio – Pertusato                                     |
| Caloplaca sp. (Guil.)                   | 2 PM-D  | Bonifacio – Pertusato                                     |
| Caloplaca sp. (Guil.)                   | 3 AM-E1 | À 6 km du col de Vizzavona – Alt. 1100 m, neige           |
| Candelariella vitellina                 | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| Candelariella vitellina                 | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| Candelariella vitellina                 | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| Candelariella sp. (Bell.)               | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| Cetraria aculeata                       | 1 PM-B  | Landes de Campo dell'Oro près d'Ajaccio                   |
| Cetraria aculeata                       | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| Cetraria chlorophylla                   | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| Cetraria chlorophylla                   | 5 PM-I  | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière – Alt. 1100-1200 m      |
| Cetrelia olivetorum                     | 5 PM-I  | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière – Alt. 1100-1200 m      |
| Chrysothrix candelaris                  | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla – Alt. 700 m     |
| Chrysothrix candelaris                  | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari – Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| Chrysothrix candelaris                  | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| Cladonia cervicornis                    | 1 PM-B  | Landes de Campo dell'Oro près d'Ajaccio                   |
| Cladonia cervicornis v. cervicornis     | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla – Alt. 700 m     |
| Cladonia cervicornis v. cervicornis     | 4 AM-F2 | Dans le "maquis corse"                                    |
| Cladonia cervicornis v. cervicornis     | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| Cladonia cervicornis v. verticillata    | 4 AM-F2 | Dans le "maquis corse"                                    |
| Cladonia cervicornis v. verticillata    | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| Cladonia gr. chlorophaea (Guil.)        | 5 PM-I  | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière – Alt. 1100-1200 m      |
| Cladonia ciliata ? (à vérifier) (Guil.) | 3 AM-E2 | Gorges du Prunelli – Alt. 600 m                           |
| Cladonia coccifera                      | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| Cladonia gr. coccifera (Guil.)          | 5 PM-I  | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière – Alt. 1100-1200 m      |
| Cladonia coccifera                      | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| Cladonia coniocraea                     | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla – Alt. 700 m     |
| Cladonia coniocraea                     | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| Cladonia digitata                       | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| Cladonia fimbriata                      | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari – Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| Cladonia fimbriata                      | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| Cladonia firma                          | 1 PM-B  | Landes de Campo dell'Oro près d'Ajaccio                   |
| Cladonia firma                          | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| Cladonia foliacea                       | 3 AM-E2 | Gorges du Prunelli – Alt. 600 m                           |

|                                             |         |                                                           |
|---------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| Cladonia foliacea                           | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari - Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| Cladonia foliacea                           | 4 AM-F2 | Dans le "maquis corse"                                    |
| Cladonia foliacea                           | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari - Col de Cortonu - Alt. 523 m |
| Cladonia foliacea                           | 6 AM-J  | Col de Vizzavona - Cascade des Anglais - Alt. 1100 m      |
| Cladonia foliacea v. foliacea               | 1 PM-B  | Landes de Campo dell'Oro près d'Ajaccio                   |
| Cladonia furcata                            | 1 PM-B  | Landes de Campo dell'Oro près d'Ajaccio                   |
| Cladonia furcata                            | 3 AM-E2 | Gorges du Prunelli - Alt. 600 m                           |
| Cladonia furcata                            | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla - Alt. 700 m     |
| Cladonia furcata                            | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari - Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| Cladonia furcata                            | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone - Platières et rochers                     |
| Cladonia humilis                            | 1 PM-B  | Landes de Campo dell'Oro près d'Ajaccio                   |
| Cladonia humilis                            | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari - Col de Cortonu - Alt. 523 m |
| Cladonia ochrochlora                        | 5 PM-I  | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière - Alt. 1100-1200 m      |
| Cladonia mediterranea                       | 1 PM-B  | Landes de Campo dell'Oro près d'Ajaccio                   |
| Cladonia mediterranea                       | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari - Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| Cladonia mediterranea                       | 4 AM-F2 | Dans le "maquis corse"                                    |
| Cladonia mediterranea                       | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari - Col de Cortonu - Alt. 523 m |
| Cladonia polydactyla                        | 5 PM-I  | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière - Alt. 1100-1200 m      |
| Cladonia pseudopytirea                      | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone - Platières et rochers                     |
| Cladonia pyxidata                           | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari - Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| Cladonia pyxidata                           | 6 AM-J  | Col de Vizzavona - Cascade des Anglais - Alt. 1100 m      |
| Cladonia ramulosa                           | 3 AM-E2 | Gorges du Prunelli - Alt. 600 m                           |
| Cladonia rangiformis                        | 1 PM-B  | Landes de Campo dell'Oro près d'Ajaccio                   |
| Cladonia rangiformis                        | 3 AM-E2 | Gorges du Prunelli - Alt. 600 m                           |
| Cladonia rangiformis                        | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari - Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| Cladonia rangiformis                        | 4 AM-F2 | Dans le "maquis corse"                                    |
| Cladonia rangiformis                        | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari - Col de Cortonu - Alt. 523 m |
| Cladonia rangiformis                        | 6 AM-J  | Col de Vizzavona - Cascade des Anglais - Alt. 1100 m      |
| Cladonia subcervicornis                     | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari - Col de Cortonu - Alt. 523 m |
| Cladonia subrangiformis                     | 1 PM-B  | Landes de Campo dell'Oro près d'Ajaccio                   |
| Cladonia subulata                           | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari - Col de Cortonu - Alt. 523 m |
| Cladonia subulata                           | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone - Platières et rochers                     |
| Cladonia symphicarpa                        | 3 AM-E2 | Gorges du Prunelli - Alt. 600 m                           |
| Cladonia symphicarpa                        | 4 AM-F2 | Dans le "maquis corse"                                    |
| Cladonia symphicarpa                        | 6 AM-J  | Col de Vizzavona - Cascade des Anglais - Alt. 1100 m      |
| Cladonia sp. (Bell.)                        | 5 PM-I  | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière - Alt. 1100-1200 m      |
| Collema flaccidum                           | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Collema rysssoleum                          | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari - Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| Collema sp. (petit C. en coussinet) (Guil.) | 3 AM-E2 | Gorges du Prunelli - Alt. 600 m                           |
| Collema sp. 1 (Guil.)                       | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla - Alt. 700 m     |
| Collema sp. 2 (Guil.)                       | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla - Alt. 700 m     |
| Cornicularia normoerica                     | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone - Platières et rochers                     |
| Dermatocarpon weberi                        | 6 AM-J  | Col de Vizzavona - Cascade des Anglais - Alt. 1100 m      |
| Dimelaena oreina                            | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone - Platières et rochers                     |
| Diploicia canescens                         | 1 PM-B  | Landes de Campo dell'Oro près d'Ajaccio                   |
| Diploicia canescens                         | 2 PM-D  | Bonifacio - Pertusato                                     |
| Diploicia subcanescens                      | 1 AM-A  | Pointe de la Parata                                       |
| Diploschistes actinostomus                  | 1 AM-A  | Pointe de la Parata                                       |
| Diploschistes bisporus                      | 6 AM-J  | Col de Vizzavona - Cascade des Anglais - Alt. 1100 m      |
| Diploschistes scruposus                     | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari - Col de Cortonu - Alt. 523 m |
| Diploschistes scruposus                     | 6 AM-J  | Col de Vizzavona - Cascade des Anglais - Alt. 1100 m      |
| Dirina ceratoniae                           | 2 PM-D  | Bonifacio - Pertusato                                     |
| Dirina massiliensis f. massiliensis         | 1 AM-A  | Pointe de la Parata                                       |
| Dirina massiliensis f. sorediata            | 1 AM-A  | Pointe de la Parata                                       |
| Dirina massiliensis v. patronii             | 1 AM-A  | Pointe de la Parata                                       |

|                                     |         |                                                           |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| Enterographa zonata                 | 6 AM-J  | Col de Vizzavona - Cascade des Anglais - Alt. 1100 m      |
| Evernia divaricata                  | 5 PM-I  | Forêt d'Aïtone, hêtraie sapinière - Alt. 1100-1200 m      |
| Evernia illyrica                    | 5 PM-I  | Forêt d'Aïtone, hêtraie sapinière - Alt. 1100-1200 m      |
| Evernia prunastri                   | 3 AM-E2 | Gorges du Prunelli - Alt. 600 m                           |
| Evernia prunastri                   | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari - Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| Evernia prunastri                   | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari - Col de Cortonu - Alt. 523 m |
| Evernia prunastri                   | 5 PM-I  | Forêt d'Aïtone, hêtraie sapinière - Alt. 1100-1200 m      |
| Evernia prunastri v. arenaria       | 1 PM-B  | Landes de Campo dell'Oro près d'Ajaccio                   |
| Evernia prunastri v. prunastri      | 1 PM-B  | Landes de Campo dell'Oro près d'Ajaccio                   |
| Fuscidea cyathoides                 | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Fuscidea cyathoides (saxicole)      | 4 AM-F2 | Dans le "maquis corse"                                    |
| Fuscidea cyathoides                 | 5 AM-H  | Forêt d'Aïtone - Platières et rochers                     |
| Fuscidea cyathoides (corticole)     | 5 PM-I  | Forêt d'Aïtone, hêtraie sapinière - Alt. 1100-1200 m      |
| Fuscidea cyathoides (corticole)     | 6 AM-J  | Col de Vizzavona - Cascade des Anglais - Alt. 1100 m      |
| Fuscidea kochiana                   | 5 AM-H  | Forêt d'Aïtone - Platières et rochers                     |
| Fuscidea mollis ? (sorédié) (Guil.) | 6 AM-J  | Col de Vizzavona - Cascade des Anglais - Alt. 1100 m      |
| Fuscidea sp. (Bell.)                | 1 AM-A  | Pointe de la Parata                                       |
| Fuscidea sp. (Guil.)                | 6 AM-J  | Col de Vizzavona - Cascade des Anglais - Alt. 1100 m      |
| Graphis cf. (pyncides ?) (Bell.)    | 6 AM-J  | Col de Vizzavona - Cascade des Anglais - Alt. 1100 m      |
| Haematomma ochroleucum              | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari - Col de Cortonu - Alt. 523 m |
| Haematomma ochroleucum              | 5 AM-H  | Forêt d'Aïtone - Platières et rochers                     |
| Heterodermia obscurata              | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari - Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| Heterodermia obscurata              | 4 AM-F2 | Dans le "maquis corse"                                    |
| Heterodermia obscurata              | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari - Col de Cortonu - Alt. 523 m |
| Hypogymnia farinacea                | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari - Col de Cortonu - Alt. 523 m |
| Hypogymnia farinacea                | 5 AM-H  | Forêt d'Aïtone - Platières et rochers                     |
| Hypogymnia farinacea                | 5 PM-I  | Forêt d'Aïtone, hêtraie sapinière - Alt. 1100-1200 m      |
| Hypogymnia physodes                 | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari - Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| Hypogymnia physodes                 | 4 AM-F2 | Dans le "maquis corse"                                    |
| Hypogymnia physodes                 | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari - Col de Cortonu - Alt. 523 m |
| Hypogymnia physodes                 | 5 AM-H  | Forêt d'Aïtone - Platières et rochers                     |
| Hypogymnia physodes                 | 5 PM-I  | Forêt d'Aïtone, hêtraie sapinière - Alt. 1100-1200 m      |
| Hypogymnia tubulosa                 | 3 AM-E2 | Gorges du Prunelli - Alt. 600 m                           |
| Hypogymnia tubulosa                 | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari - Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| Hypogymnia tubulosa                 | 4 AM-F2 | Dans le "maquis corse"                                    |
| Hypogymnia tubulosa                 | 5 AM-H  | Forêt d'Aïtone - Platières et rochers                     |
| Hypogymnia tubulosa                 | 5 PM-I  | Forêt d'Aïtone, hêtraie sapinière - Alt. 1100-1200 m      |
| Immersaria athrocarpa               | 6 AM-J  | Col de Vizzavona - Cascade des Anglais - Alt. 1100 m      |
| Lasallia brisantium                 | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Lasallia pustulata                  | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Lasallia pustulata                  | 3 AM-E2 | Gorges du Prunelli - Alt. 600 m                           |
| Lasallia pustulata                  | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari - Col de Cortonu - Alt. 523 m |
| Lasallia pustulata                  | 5 AM-H  | Forêt d'Aïtone - Platières et rochers                     |
| Lecanactis abietina                 | 5 PM-I  | Forêt d'Aïtone, hêtraie sapinière - Alt. 1100-1200 m      |
| Lecanora albescens                  | 4 AM-F3 | Plage des paillotes, sur les rochers                      |
| Lecanora gr. argentata (Guil.)      | 5 PM-I  | Forêt d'Aïtone, hêtraie sapinière - Alt. 1100-1200 m      |
| Lecanora bandolensis                | 2 PM-D  | Bonifacio - Pertusato                                     |
| Lecanora cenisia                    | 6 AM-J  | Col de Vizzavona - Cascade des Anglais - Alt. 1100 m      |
| Lecanora cenisia v. atrynea         | 6 AM-J  | Col de Vizzavona - Cascade des Anglais - Alt. 1100 m      |
| Lecanora chlarotera                 | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari - Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| Lecanora gangaleoides               | 1 AM-A  | Pointe de la Parata                                       |
| Lecanora gangaleoides               | 4 AM-F3 | Plage des paillotes, sur les rochers                      |
| Lecanora glabrata                   | 5 PM-I  | Forêt d'Aïtone, hêtraie sapinière - Alt. 1100-1200 m      |
| Lecanora intricata                  | 6 AM-J  | Col de Vizzavona - Cascade des Anglais - Alt. 1100 m      |
| Lecanora laatokkaensis              | 5 AM-H  | Forêt d'Aïtone - Platières et rochers                     |

|                                           |         |                                                           |
|-------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| Lecanora lividocinerea                    | 1 PM-B  | Landes de Campo dell'Oro près d'Ajaccio                   |
| Lecanora lividocinerea                    | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Lecanora lividocinerea                    | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari – Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| Lecanora muralis                          | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Lecanora muralis                          | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| Lecanora muralis ssp. bolcana             | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| Lecanora muralis ssp. bolcana             | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| Lecanora muralis v. muralis               | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| Lecanora gr. piniperda (Guil.)            | 5 PM-I  | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière – Alt. 1100-1200 m      |
| Lecanora polytropa                        | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| Lecanora rupicola v. sulphurata           | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| Lecanora rupicola v. sulphurata           | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| Lecanora schistina                        | 1 AM-A  | Pointe de la Parata                                       |
| Lecanora subcarnea                        | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| Lecanora subcarnea                        | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| Lecanora subrugosa ? (Guil.)              | 5 PM-I  | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière – Alt. 1100-1200 m      |
| Lecanora sulphurea                        | 1 AM-A  | Pointe de la Parata                                       |
| Lecanora sulphurea                        | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| Lecanora cf. venskei (Bell.)              | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| Lecanora sp. (Guil.)                      | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari – Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| Lecidea confluens                         | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla – Alt. 700 m     |
| Lecidea confluens                         | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| Lecidea fuscoatra                         | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| Lecidea fuscoatra v. grisella             | 3 AM-E2 | Gorges du Prunelli – Alt. 600 m                           |
| Lecidea fuscoatra v. grisella             | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| Lecidea gr. lactea (Guil.)                | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| Lecidella carpathica                      | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| Lecidella elaeochroma                     | 1 PM-B  | Landes de Campo dell'Oro près d'Ajaccio                   |
| Lecidella elaeochroma                     | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari – Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| Lecidella subincongrua v. elaeochromoides | 1 AM-A  | Pointe de la Parata                                       |
| Lecidella s- v. elaeochromoides ? (Bell.) | 1 AM-A  | Pointe de la Parata                                       |
| Lepraria incana                           | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| Leproloma membranacea                     | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| Letharia divaricata ? (Guei.)             | 5 PM-I  | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière – Alt. 1100-1200 m      |
| Lethariella divaricata                    | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| Lethariella divaricata                    | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| Lethariella intritica ? (Guei.)           | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| Lethariella intritica ? (Guei.)           | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| Lobaria amplissima                        | 3 AM-E1 | À 6 km du col de Vizzavona – Alt. 1100 m, neige           |
| Lobaria amplissima                        | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla – Alt. 700 m     |
| Lobaria amplissima                        | 5 PM-I  | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière – Alt. 1100-1200 m      |
| Lobaria amplissima                        | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| Lobaria pulmonaria                        | 3 AM-E1 | À 6 km du col de Vizzavona – Alt. 1100 m, neige           |
| Lobaria pulmonaria                        | 3 AM-E2 | Gorges du Prunelli – Alt. 600 m                           |
| Lobaria pulmonaria                        | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla – Alt. 700 m     |
| Lobaria pulmonaria (sur olivier)          | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari – Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| Lobaria pulmonaria                        | 5 PM-I  | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière – Alt. 1100-1200 m      |
| Lobaria pulmonaria                        | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| Lobaria scrobiculata                      | 3 AM-E2 | Gorges du Prunelli – Alt. 600 m                           |
| Lobaria scrobiculata                      | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla – Alt. 700 m     |
| Lobaria scrobiculata                      | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| Lobaria sp. (Bell.)                       | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla – Alt. 700 m     |
| Miriqidica deusta                         | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| Nephroma laevigatum                       | 3 AM-E2 | Gorges du Prunelli – Alt. 600 m                           |
| Nephroma laevigatum                       | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla – Alt. 700 m     |

|                                           |         |                                                           |
|-------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| Nephroma laevigatum                       | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari - Col de Cortonu - Alt. 523 m |
| Nephroma laevigatum                       | 5 PM-I  | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière - Alt. 1100-1200 m      |
| Nephroma laevigatum                       | 6 AM-J  | Col de Vizzavona - Cascade des Anglais - Alt. 1100 m      |
| Normandina pulchella                      | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla - Alt. 700 m     |
| Normandina pulchella                      | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari - Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| Ochrolechia androgyna                     | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla - Alt. 700 m     |
| Ochrolechia corsicana (sorédié) ? (Guil.) | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone - Platières et rochers                     |
| Ochrolechia sp. corsicana ? (Bell.)       | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone - Platières et rochers                     |
| Ochrolechia pallescens                    | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari - Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| Ochrolechia pallescens                    | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari - Col de Cortonu - Alt. 523 m |
| Ochrolechia parella                       | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Ochrolechia parella                       | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari - Col de Cortonu - Alt. 523 m |
| Ochrolechia subviridis                    | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla - Alt. 700 m     |
| Ochrolechia tartarea                      | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari - Col de Cortonu - Alt. 523 m |
| Ochrolechia tartarea                      | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone - Platières et rochers                     |
| Ochrolechia sp. (Bell.)                   | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla - Alt. 700 m     |
| Ochrolechia sp. (Guil.)                   | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari - Col de Cortonu - Alt. 523 m |
| Ochrolechia sp. (sorédié) (Guil.)         | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari - Col de Cortonu - Alt. 523 m |
| Opegrapha calcarea                        | 2 PM-D  | Bonifacio - Pertusato                                     |
| Opegrapha corticola                       | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari - Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| Opegrapha durieui                         | 2 PM-D  | Bonifacio - Pertusato                                     |
| Opegrapha grumulosa                       | 2 PM-D  | Bonifacio - Pertusato                                     |
| Opegrapha sp. (Bell.)                     | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Opegrapha sp. (Guil.)                     | 2 PM-D  | Bonifacio - Pertusato                                     |
| Opegrapha sp. (Bell.)                     | 2 PM-D  | Bonifacio - Pertusato                                     |
| Pachyphiale cornea                        | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla - Alt. 700 m     |
| Pannaria conoplea                         | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla - Alt. 700 m     |
| Pannaria mediterranea                     | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari - Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| Parmelia borrieri ? (Guei.)               | 1 PM-B  | Landes de Campo dell'Oro près d'Ajaccio                   |
| Parmelia caperata                         | 1 PM-B  | Landes de Campo dell'Oro près d'Ajaccio                   |
| Parmelia caperata                         | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Parmelia caperata                         | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla - Alt. 700 m     |
| Parmelia caperata                         | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari - Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| Parmelia conspersa                        | 3 AM-E2 | Gorges du Prunelli - Alt. 600 m                           |
| Parmelia conspersa v. conspersa           | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Parmelia conspersa ssp. tinctina          | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Parmelia conspersa v. conspersa           | 4 AM-F2 | Dans le "maquis corse"                                    |
| Parmelia conspersa v. conspersa           | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari - Col de Cortonu - Alt. 523 m |
| Parmelia contorta                         | 3 AM-E1 | À 6 km du col de Vizzavona - Alt. 1100 m, neige           |
| Parmelia contorta                         | 3 AM-E2 | Gorges du Prunelli - Alt. 600 m                           |
| Parmelia elegantula                       | 6 AM-J  | Col de Vizzavona - Cascade des Anglais - Alt. 1100 m      |
| Parmelia exasperata                       | 3 AM-E2 | Gorges du Prunelli - Alt. 600 m                           |
| Parmelia glabratula v. fuliginosa         | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari - Col de Cortonu - Alt. 523 m |
| Parmelia glabratula v. fuliginosa         | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone - Platières et rochers                     |
| Parmelia glabratula v. glabratula         | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari - Col de Cortonu - Alt. 523 m |
| Parmelia hypoleucina                      | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari - Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| Parmelia laciniatula                      | 5 PM-I  | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière - Alt. 1100-1200 m      |
| Parmelia laciniatula                      | 6 AM-J  | Col de Vizzavona - Cascade des Anglais - Alt. 1100 m      |
| Parmelia loxodes                          | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Parmelia omphalodes                       | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone - Platières et rochers                     |
| Parmelia perlata                          | 1 PM-B  | Landes de Campo dell'Oro près d'Ajaccio                   |
| Parmelia perlata                          | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Parmelia perlata                          | 3 AM-E2 | Gorges du Prunelli - Alt. 600 m                           |
| Parmelia perlata                          | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari - Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| Parmelia perlata                          | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari - Col de Cortonu - Alt. 523 m |

|                                                  |         |                                                           |
|--------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| <i>Parmelia pulla</i>                            | 1 AM-A  | Pointe de la Parata                                       |
| <i>Parmelia pulla</i>                            | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| <i>Parmelia pulla</i>                            | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla – Alt. 700 m     |
| <i>Parmelia pulla</i>                            | 4 AM-F2 | Dans le "maquis corse"                                    |
| <i>Parmelia pulla</i>                            | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| <i>Parmelia pulla</i>                            | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| <i>Parmelia quercina</i>                         | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla – Alt. 700 m     |
| <i>Parmelia quercina</i>                         | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari – Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| <i>Parmelia quercina</i>                         | 4 AM-F2 | Dans le "maquis corse"                                    |
| <i>Parmelia quercina</i>                         | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| <i>Parmelia reticulata</i>                       | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| <i>Parmelia reticulata</i>                       | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari – Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| <i>Parmelia saxatilis</i>                        | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| <i>Parmelia saxatilis</i>                        | 3 AM-E2 | Gorges du Prunelli – Alt. 600 m                           |
| <i>Parmelia saxatilis</i>                        | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla – Alt. 700 m     |
| <i>Parmelia saxatilis</i>                        | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari – Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| <i>Parmelia saxatilis</i>                        | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| <i>Parmelia saxatilis</i>                        | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| <i>Parmelia saxatilis</i>                        | 5 PM-I  | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière – Alt. 1100-1200 m      |
| <i>Parmelia saxatilis</i>                        | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| <i>Parmelia somloensis</i>                       | 1 PM-B  | Landes de Campo dell'Oro près d'Ajaccio                   |
| <i>Parmelia somloensis</i>                       | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| <i>Parmelia somloensis</i>                       | 3 AM-E2 | Gorges du Prunelli – Alt. 600 m                           |
| <i>Parmelia somloensis</i>                       | 3 PM-E  | Col de Mercujo, vers le village de Tolla – Alt. 700 m     |
| <i>Parmelia somloensis</i>                       | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| <i>Parmelia somloensis</i>                       | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| <i>Parmelia soredians</i>                        | 1 PM-B  | Landes de Campo dell'Oro près d'Ajaccio                   |
| <i>Parmelia soredians</i>                        | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| <i>Parmelia soredians</i>                        | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari – Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| <i>Parmelia stygia</i>                           | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| <i>Parmelia stygia</i> v. <i>septentrionalis</i> | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| <i>Parmelia stygia</i> v. <i>septentrionalis</i> | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| <i>Parmelia subaurifera</i>                      | 1 PM-B  | Landes de Campo dell'Oro près d'Ajaccio                   |
| <i>Parmelia subaurifera</i>                      | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari – Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| <i>Parmelia subaurifera</i>                      | 4 AM-F2 | Dans le "maquis corse"                                    |
| <i>Parmelia submontana</i>                       | 5 PM-I  | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière – Alt. 1100-1200 m      |
| <i>Parmelia submontana</i>                       | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| <i>Parmelia subrudecta</i>                       | 1 PM-B  | Landes de Campo dell'Oro près d'Ajaccio                   |
| <i>Parmelia subrudecta</i>                       | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari – Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| <i>Parmelia sulcata</i>                          | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla – Alt. 700 m     |
| <i>Parmelia sulcata</i>                          | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari – Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| <i>Parmelia sulcata</i>                          | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| <i>Parmelia sulcata</i>                          | 5 PM-I  | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière – Alt. 1100-1200 m      |
| <i>Parmelia tiliacea</i>                         | 1 PM-B  | Landes de Campo dell'Oro près d'Ajaccio                   |
| <i>Parmelia tiliacea</i>                         | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| <i>Parmelia tiliacea</i>                         | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla – Alt. 700 m     |
| <i>Parmelia tiliacea</i>                         | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari – Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| <i>Parmelia tinctoria</i>                        | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| <i>Parmelia</i> sp. (Guil.)                      | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari – Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| <i>Parmelia</i> sp. (Guil.)                      | 5 PM-I  | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière – Alt. 1100-1200 m      |
| <i>Parmeliella plumbea</i>                       | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla – Alt. 700 m     |
| <i>Parmeliella plumbea</i>                       | 5 PM-I  | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière – Alt. 1100-1200 m      |
| <i>Patellariaceae</i> ? (Bell.)                  | 1 PM-B  | Landes de Campo dell'Oro près d'Ajaccio                   |
| <i>Peltigera collina</i>                         | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla – Alt. 700 m     |
| <i>Peltigera collina</i>                         | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |

|                                                     |         |                                                           |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| <i>Peltigera horizontalis</i>                       | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| <i>Peltigera horizontalis</i>                       | 5 PM-I  | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière – Alt. 1100-1200 m      |
| <i>Peltigera horizontalis</i>                       | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| <i>Peltigera cf. horizontalis</i> (Bell.)           | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| <i>Peltigera membranacea</i>                        | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| <i>Peltigera neopolydactyla</i>                     | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| <i>Peltigera polydactyla</i> (ou du groupe) (Guil.) | 3 AM-E1 | À 6 km du col de Vizzavona – Alt. 1100 m, neige           |
| <i>Peltigera praetextata</i>                        | 3 AM-E1 | À 6 km du col de Vizzavona – Alt. 1100 m, neige           |
| <i>Peltigera praetextata</i>                        | 3 PM-E  | Col de Mercujo, vers le village de Tolla – Alt. 700 m     |
| <i>Peltigera praetextata</i>                        | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| <i>Peltigera rufescens</i>                          | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| <i>Peltigera sp.</i> (Bell.)                        | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla – Alt. 700 m     |
| <i>Pertusaria albescens</i>                         | 3 AM-E2 | Gorges du Prunelli – Alt. 600 m                           |
| <i>Pertusaria albescens</i>                         | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla – Alt. 700 m     |
| <i>Pertusaria albescens</i>                         | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari – Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| <i>Pertusaria albescens</i>                         | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| <i>Pertusaria albescens</i>                         | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| <i>Pertusaria amara</i>                             | 1 PM-B  | Landes de Campo dell'Oro près d'Ajaccio                   |
| <i>Pertusaria amara</i>                             | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla – Alt. 700 m     |
| <i>Pertusaria amara</i>                             | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari – Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| <i>Pertusaria amara</i>                             | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| <i>Pertusaria amara</i>                             | 5 PM-I  | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière – Alt. 1100-1200 m      |
| <i>Pertusaria coccodes</i>                          | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla – Alt. 700 m     |
| <i>Pertusaria corallina</i>                         | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| <i>Pertusaria corallina</i>                         | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| <i>Pertusaria excludens</i>                         | 3 AM-E2 | Gorges du Prunelli – Alt. 600 m                           |
| <i>Pertusaria excludens</i>                         | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla – Alt. 700 m     |
| <i>Pertusaria excludens</i>                         | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| <i>Pertusaria excludens</i>                         | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| <i>Pertusaria excludens</i>                         | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| <i>Pertusaria hemisphaerica</i>                     | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari – Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| <i>Pertusaria hemisphaerica</i> ? (Guil.)           | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari – Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| <i>Pertusaria hemisphaerica</i> ? (Guil.)           | 5 PM-I  | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière – Alt. 1100-1200 m      |
| <i>Pertusaria hymenea</i>                           | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| <i>Pertusaria leioplaca</i>                         | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari – Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| <i>Pertusaria mammosa</i>                           | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| <i>Pertusaria mammosa</i>                           | 4 AM-F3 | Plage des paillotes, sur les rochers                      |
| <i>Pertusaria mammosa</i>                           | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| <i>Pertusaria mammosa</i>                           | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| <i>Pertusaria cf. pertusa</i> (Bell.)               | 1 AM-A  | Pointe de la Parata                                       |
| <i>Pertusaria cf. pertusa</i> (Guil.)               | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| <i>Pertusaria pertusa</i> ? (Guil.)                 | 5 PM-I  | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière – Alt. 1100-1200 m      |
| <i>Pertusaria pluripuncta</i>                       | 1 AM-A  | Pointe de la Parata                                       |
| <i>Pertusaria pluripuncta</i>                       | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| <i>Pertusaria pseudocorallina</i>                   | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| <i>Pertusaria pseudocorallina</i>                   | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| <i>Pertusaria pseudocorallina</i>                   | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| <i>Pertusaria rupestris</i>                         | 1 AM-A  | Pointe de la Parata                                       |
| <i>Pertusaria rupicola</i>                          | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| <i>Pertusaria rupicola</i>                          | 4 AM-F3 | Plage des paillotes, sur les rochers                      |
| <i>Pertusaria rupicola</i>                          | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| <i>Pertusaria rupicola</i>                          | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| <i>Pertusaria rupicola</i>                          | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| <i>Pertusaria stérile parasité</i> (Guil.)          | 4 AM-F3 | Plage des paillotes, sur les rochers                      |
| <i>Pertusaria sp.</i> (Guil.)                       | 1 AM-A  | Pointe de la Parata                                       |

|                                                |         |                                                           |
|------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| <i>Pertusaria</i> sp. (Bell.)                  | 1 AM-A  | Pointe de la Parata                                       |
| <i>Pertusaria</i> sp. (Guil.)                  | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla – Alt. 700 m     |
| <i>Pertusaria</i> sp. (Guil.)                  | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari – Ruisseau de Zirione. Alt. 20 à 30 m   |
| <i>Pertusaria</i> sp. 1 (K+ jaune vif) (Guil.) | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| <i>Pertusaria</i> sp. 2 (K+ rouge) (Guil.)     | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| <i>Pertusaria</i> sp. 1 (Bell.)                | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| <i>Pertusaria</i> sp. 2 (Bell.)                | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| <i>Pertusaria</i> sp. (Guil.)                  | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| <i>Pertusaria subcorallina</i>                 | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| <i>Phlyctis agelaea</i>                        | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari – Ruisseau de Zirione. Alt. 20 à 30 m   |
| <i>Phlyctis argena</i>                         | 3 AM-E2 | Gorges du Prunelli – Alt. 600 m                           |
| <i>Phlyctis argena</i>                         | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla – Alt. 700 m     |
| <i>Phlyctis argena</i>                         | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari – Ruisseau de Zirione. Alt. 20 à 30 m   |
| <i>Physcia adscendens</i>                      | 1 PM-B  | Landes de Campo dell'Oro près d'Ajaccio                   |
| <i>Physcia adscendens</i>                      | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| <i>Physcia adscendens</i>                      | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari – Ruisseau de Zirione. Alt. 20 à 30 m   |
| <i>Physcia aipolia</i>                         | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| <i>Physcia aipolia</i>                         | 3 AM-E1 | À 6 km du col de Vizzavona – Alt. 1100 m, neige           |
| <i>Physcia aipolia</i>                         | 4 AM-F2 | Dans le "maquis corse"                                    |
| <i>Physcia caesia</i>                          | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| <i>Physcia</i> sp. (Guil.)                     | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| <i>Physconia distorta</i>                      | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| <i>Physconia distorta</i>                      | 4 AM-F2 | Dans le "maquis corse"                                    |
| <i>Physconia distorta</i>                      | 5 PM-I  | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière – Alt. 1100-1200 m      |
| <i>Physconia distorta</i>                      | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| <i>Physconia distorta</i> v. <i>subvenusta</i> | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| <i>Physconia venusta</i>                       | 3 AM-E1 | À 6 km du col de Vizzavona – Alt. 1100 m, neige           |
| <i>Physconia venusta</i>                       | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla – Alt. 700 m     |
| <i>Physconia venusta</i>                       | 5 PM-I  | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière – Alt. 1100-1200 m      |
| <i>Physconia venusta</i>                       | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| <i>Platismatia glauca</i>                      | 4 AM-F2 | Dans le "maquis corse"                                    |
| <i>Platismatia glauca</i>                      | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| <i>Platismatia glauca</i>                      | 5 PM-I  | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière – Alt. 1100-1200 m      |
| <i>Platismatia glauca</i>                      | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| <i>Porpidia cinereoatra</i>                    | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla – Alt. 700 m     |
| <i>Porpidia cinereoatra</i>                    | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| <i>Porpidia cinereoatra</i>                    | 5 PM-I  | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière – Alt. 1100-1200 m      |
| <i>Porpidia crustulata</i>                     | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla – Alt. 700 m     |
| <i>Porpidia glaucophaea</i> ? (Guil.)          | 5 PM-I  | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière – Alt. 1100-1200 m      |
| <i>Porpidia glaucophaea</i> ? (Guil.)          | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| <i>Porpidia tuberculosa</i>                    | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| <i>Porpidia tuberculosa</i> ? (Guil.)          | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| <i>Porpidia</i> sp. 1 (Bell.)                  | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla – Alt. 700 m     |
| <i>Porpidia</i> sp. 2 (Bell.)                  | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla – Alt. 700 m     |
| <i>Porpidia</i> sp. 3 (Bell.)                  | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla – Alt. 700 m     |
| <i>Porpidia</i> sp. (Bell.)                    | 5 PM-I  | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière – Alt. 1100-1200 m      |
| <i>Protoparmelia badia</i>                     | 1 AM-A  | Pointe de la Parata                                       |
| <i>Protoparmelia badia</i>                     | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| <i>Pseudevernia furfuracea</i>                 | 1 PM-B  | Landes de Campo dell'Oro près d'Ajaccio                   |
| <i>Pseudevernia furfuracea</i>                 | 3 AM-E2 | Gorges du Prunelli – Alt. 600 m                           |
| <i>Pseudevernia furfuracea</i>                 | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| <i>Pseudevernia furfuracea</i>                 | 5 PM-I  | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière – Alt. 1100-1200 m      |
| <i>Pseudevernia furfuracea</i>                 | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| <i>Psilolechia lucida</i>                      | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| <i>Psilolechia lucida</i>                      | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |

|                                             |         |                                                           |
|---------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| Pyreno lirelliforme ? (Bell.)               | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Pyrrhospora quereana                        | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Pyrrhospora quereana                        | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla – Alt. 700 m     |
| Pyrrhospora quereana                        | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari – Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| Ramalina breviuscula                        | 1 AM-A  | Pointe de la Parata                                       |
| Ramalina breviuscula ? (Guil.)              | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Ramalina calicaris                          | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari – Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| Ramalina calicaris                          | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| Ramalina canariensis                        | 1 PM-B  | Landes de Campo dell'Oro près d'Ajaccio                   |
| Ramalina canariensis                        | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Ramalina canariensis                        | 2 PM-D  | Bonifacio – Pertusato                                     |
| Ramalina canariensis                        | 4 AM-F2 | Dans le "maquis corse"                                    |
| Ramalina sp. cf. clementeana (Guil.)        | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| Ramalina farinacea                          | 1 PM-B  | Landes de Campo dell'Oro près d'Ajaccio                   |
| Ramalina farinacea                          | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari – Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| Ramalina farinacea                          | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| Ramalina farinacea                          | 5 PM-I  | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière – Alt. 1100-1200 m      |
| Ramalina farinacea                          | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| Ramalina fastigiata                         | 1 PM-B  | Landes de Campo dell'Oro près d'Ajaccio                   |
| Ramalina fastigiata                         | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari – Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| Ramalina fastigiata ? (Guil.)               | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari – Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| Ramalina fastigiata ? (Guei.)               | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| Ramalina fastigiata/vizzavonensis ? (Guil.) | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| Ramalina fraxinea                           | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Ramalina implectens                         | 1 AM-A  | Pointe de la Parata                                       |
| Ramalina implectens                         | 1 PM-B  | Landes de Campo dell'Oro près d'Ajaccio                   |
| Ramalina implectens                         | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari – Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| Ramalina lusitanica                         | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Ramalina lusitanica ? (Guil.)               | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Ramalina pollinaria                         | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Ramalina polymorpha                         | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Ramalina polymorpha                         | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| Ramalina polymorpha ? (Guil.)               | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| Ramalina panizzei                           | 1 PM-B  | Landes de Campo dell'Oro près d'Ajaccio                   |
| Ramalina pusilla                            | 1 PM-B  | Landes de Campo dell'Oro près d'Ajaccio                   |
| Ramalina pusilla                            | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Ramalina pusilla                            | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari – Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| Ramalina requienii                          | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Ramalina requienii                          | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| Ramalina subfarinacea                       | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Ramalina subfarinacea ? (Guil.)             | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari – Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| Ramalina subfarinacea                       | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| Ramalina subfarinacea                       | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| Ramalina sp. (saxicole) (Bell.)             | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Ramalina sp. (Guil.)                        | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari – Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| Ramalina sp. (Bell.)                        | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| Ramalina sp. (Bell.)                        | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| Ramalina sp. (Guil.)                        | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| Ramalina sp. (Guil.)                        | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| Rhizocarpon geographicum                    | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Rhizocarpon geographicum                    | 3 AM-E2 | Gorges du Prunelli – Alt. 600 m                           |
| Rhizocarpon geographicum                    | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| Rhizocarpon geographicum                    | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone – Platières et rochers                     |
| Rhizocarpon geographicum                    | 6 AM-J  | Col de Vizzavona – Cascade des Anglais – Alt. 1100 m      |
| Rhizocarpon viridiatrum                     | 3 AM-E2 | Gorges du Prunelli – Alt. 600 m                           |

|                                    |         |                                                           |
|------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| Rhizocarpon viridiatrum            | 3 AM-E2 | Gorges du Prunelli - Alt. 600 m                           |
| Rhizocarpon viridiatrum            | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone - Platières et rochers                     |
| Rimularia insularis                | 6 AM-J  | Col de Vizzavona - Cascade des Anglais - Alt. 1100 m      |
| Rinodina cf. exigua (Guil.)        | 4 AM-F2 | Dans le "maquis corse"                                    |
| Rinodina sp. (Guil.)               | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari - Col de Cortonu - Alt. 523 m |
| Rocella arnoldii                   | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Rocella fuciformis                 | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Rocella phycopsis                  | 1 AM-A  | Pointe de la Parata                                       |
| Rocella phycopsis                  | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Rocella phycopsis                  | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari - Col de Cortonu - Alt. 523 m |
| Rocella tuberculata                | 1 AM-A  | Pointe de la Parata                                       |
| Rocella tuberculata                | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Rocella vicentina                  | 1 AM-A  | Pointe de la Parata                                       |
| Schaereria fuscocinerea ? (Guil.)  | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone - Platières et rochers                     |
| Schaereria fuscocinerea ? (Guil.)  | 6 AM-J  | Col de Vizzavona - Cascade des Anglais - Alt. 1100 m      |
| Schismatomma albocincta            | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Schismatomma decolorans            | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Schismatomma decolorans            | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari - Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| Schismatomma graphioides           | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari - Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| Solenopsora olivacea               | 2 PM-D  | Bonifacio - Pertusato                                     |
| Solenopsora vulturiensis           | 4 AM-F3 | Plage des paillotes, sur les rochers                      |
| Sphaerophorus globosus             | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone - Platières et rochers                     |
| Sporastatia polyspora              | 6 AM-J  | Col de Vizzavona - Cascade des Anglais - Alt. 1100 m      |
| Stereocaulon botryosum ? (Guei.)   | 6 AM-J  | Col de Vizzavona - Cascade des Anglais - Alt. 1100 m      |
| Stereocaulon evolutum              | 6 AM-J  | Col de Vizzavona - Cascade des Anglais - Alt. 1100 m      |
| Teloschistes chrysophthalmus       | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari - Col de Cortonu - Alt. 523 m |
| Tephromela aglaea                  | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari - Col de Cortonu - Alt. 523 m |
| Tephromela aglaea ? (Bell.)        | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari - Col de Cortonu - Alt. 523 m |
| Tephromela atra ? (Guil.)          | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari - Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| Tephromela atra                    | 4 AM-F3 | Plage des paillotes, sur les rochers                      |
| Tephromela atra                    | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari - Col de Cortonu - Alt. 523 m |
| Thelotrema lepadinum               | 5 PM-I  | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière - Alt. 1100-1200 m      |
| Toninia sp. (Guil.)                | 4 AM-F3 | Plage des paillotes, sur les rochers                      |
| Umbilicaria crustulosa             | 3 AM-E2 | Gorges du Prunelli - Alt. 600 m                           |
| Umbilicaria crustulosa             | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari - Col de Cortonu - Alt. 523 m |
| Umbilicaria crustulosa ? (Guei.)   | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari - Col de Cortonu - Alt. 523 m |
| Umbilicaria crustulosa             | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone - Platières et rochers                     |
| Umbilicaria crustulosa ? (Guei.)   | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone - Platières et rochers                     |
| Umbilicaria crustulosa ? (Guei.)   | 6 AM-J  | Col de Vizzavona - Cascade des Anglais - Alt. 1100 m      |
| Umbilicaria cylindrica             | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla - Alt. 700 m     |
| Umbilicaria cylindrica             | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone - Platières et rochers                     |
| Umbilicaria hirsuta ? (Guei.)      | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone - Platières et rochers                     |
| Umbilicaria polyphylla             | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone - Platières et rochers                     |
| Umbilicaria polyrrhiza             | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari - Col de Cortonu - Alt. 523 m |
| Umbilicaria polyrrhiza             | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone - Platières et rochers                     |
| Umbilicaria sp. 1 (Guil.)          | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone - Platières et rochers                     |
| Umbilicaria sp. 2 (Guil.)          | 5 AM-H  | Forêt d'Aitone - Platières et rochers                     |
| Usnea cf. articulata (Guil.)       | 5 PM-I  | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière - Alt. 1100-1200 m      |
| Usnea cf. articulata (Bell.)       | 5 PM-I  | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière - Alt. 1100-1200 m      |
| Usnea cf. filipendula (Bell.)      | 5 PM-I  | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière - Alt. 1100-1200 m      |
| Usnea florida                      | 5 PM-I  | Forêt d'Aitone, hêtraie sapinière - Alt. 1100-1200 m      |
| Usnea sp. (Guil.)                  | 4 AM-F1 | Forêt de Chiavari - Ruisseau de Zirione. Alt 20 à 30 m    |
| Usnea sp. (Guil.)                  | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari - Col de Cortonu - Alt. 523 m |
| Verrucaria calciseda               | 2 PM-D  | Bonifacio - Pertusato                                     |
| Verrucaria macrostoma (f. isidiée) | 2 PM-D  | Bonifacio - Pertusato                                     |

|                                     |         |                                                           |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| Xanthoria parietina v. calcicola    | 1 AM-A  | Pointe de la Parata                                       |
| Xanthoria parietina v. calcicola    | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Xanthoria parietina v. calcicola    | 3 PM-E3 | Col de Mercujo, vers le village de Tolla – Alt. 700 m     |
| Xanthoria parietina v. calcicola    | 4 PM-G  | Forêt domaniale de Chiavari – Col de Cortonu – Alt. 523 m |
| Xanthoria parietina v. parietina    | 1 PM-B  | Landes de Campo dell'Oro près d'Ajaccio                   |
| Xanthoria parietina v. parietina    | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Xanthoria parietina v. parietina    | 4 AM-F2 | Dans le "maquis corse"                                    |
| Xanthoria elegans                   | 2 AM-C  | Ermitage de la Trinité                                    |
| Xanthoria resendei                  | 1 AM-A  | Pointe de la Parata                                       |
| Xanthoria resendei ? (Bell.)        | 1 AM-A  | Pointe de la Parata                                       |
| ? apothécie lécidéine noire (Bell.) | 1 PM-B  | Landes de Campo dell'Oro près d'Ajaccio                   |

**List of lichen species collected by H. Sipman  
during the AFL excursion to Corse in April 1999**

H. SIPMAN

Botanischer Garten und Museum Königin-Luise Strasse 6-8  
D – 14 195 Berlin

- |                                                 |                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <i>Acarospora veronensis</i> Massal.            | <i>Catillaria chalybeia</i> (Borr.) Massal.             |
| <i>Alectoria sarmentosa</i> (Ach.) Ach.         | <i>Catinaria atropurpurea</i> (Schaer.) Vezda           |
| <i>Anaptychia runcinata</i> (With.) Laundon     | <i>Catinaria laureri</i> (Hepp) Degel.                  |
| <i>Arthonia arthonioides</i> (Ach.) A.L. Sm.    | <i>Cetraria aculeata</i>                                |
| <i>Arthonia meridionalis</i> Zahlbr.            | <i>Cetraria chlorophylla</i>                            |
| <i>Arthonia punctiformis</i> Ach.               | <i>Cladina ciliaris</i>                                 |
| <i>Arthopyrenia?</i>                            | <i>Cladina mediterranea</i>                             |
| <i>Arthothelium crozalsianum</i> Bouly de Lesd. | <i>Cladonia cervicornis</i>                             |
| <i>Aspicilia</i>                                | <i>Cladonia firma</i>                                   |
| <i>Aspicilia caesiocinerea</i> (Nyl. ex Malbr.) | <i>Cladonia foliacea</i>                                |
| Arnold                                          | <i>Cladonia furcata</i>                                 |
| <i>Bactrospora corticola</i> (Nyl.) Almqv.      | <i>Cladonia humilis</i>                                 |
| <i>Bactrospora patellarioides</i>               | <i>Cladonia rangiformis</i>                             |
| <i>Biatora vernalis</i> (L.) Fr.                | <i>Cliostomum griffithi</i>                             |
| <i>Bryoria capillaris</i> (Ach.) Brodo & D.     | <i>Cornicularia normoerica</i>                          |
| Hawksw.                                         | <i>Dactylospora rimulicola</i> (Müll. Arg.) Haf.        |
| <i>Bryoria fuscescens</i> (Gyeln.) Brodo & D.   | <i>Dimerella pineti</i>                                 |
| Hawksw.                                         | <i>Dimerella tavaresiana</i> Vezda                      |
| <i>Bryoria implexa</i> (Hoffm.) Brodo & D.      | <i>Diploicia subdisciformis</i>                         |
| Hawksw.                                         | <i>Diploschistes scruposus</i>                          |
| <i>Buellia badia</i> (Fr.) Massal.              | <i>Dirina massiliensis</i>                              |
| <i>Buellia fimbriata</i>                        | <i>Evernia illyrica</i> Zahlbr.                         |
| <i>Buellia griseovirens</i>                     | <i>Evernia prunastri</i>                                |
| <i>Buellia subdisciformis</i> (Leight.) Vain.   | <i>Flavoparmelia soledians</i>                          |
| <i>Buellia venusta</i> (Körb.) Lettau           | <i>Fuscidea lygaea</i> (Ach.) V. Wirth & Vezda          |
| <i>Caloplaca aegatica</i> Giralt, Nimis & Poelt | <i>Haematomma ochroleucum</i>                           |
| <i>Caloplaca aff. interna?</i>                  | <i>Hemigrapha</i>                                       |
| <i>Caloplaca aractina</i> (Anzi) Jatta          | <i>Hyperphyscia adglutinata</i> (Flk.) Mayrh. & Poelt   |
| <i>Caloplaca cf. inconnexa</i>                  | <i>Hypogymnia farinacea</i> (Bitter)                    |
| <i>Caloplaca ferruginea</i> (Huds.) Th. Fr.     | <i>Hypogymnia physodes</i>                              |
| <i>Caloplaca inconnexa</i>                      | <i>Hypogymnia tubulosa</i>                              |
| <i>Caloplaca limitosa</i>                       | <i>Immersaria cupreoatra</i> (Nyl.) Calatayud & Rambold |
| <i>Caloplaca marina</i>                         | <i>Lasallia pustulata</i>                               |
| <i>Caloplaca navasiana</i>                      | <i>Lecania inundata</i> (Hepp) M. Mayrh.                |
| <i>Caloplaca ora</i> Poelt & Nimis              | <i>Lecania turicensis</i> (Hepp.) Müll. Arg.            |
| <i>Caloplaca polycarpia</i>                     | <i>Lecanographa grummulosa</i>                          |
| <i>Carbonea?</i>                                |                                                         |
| <i>Carbonea vitellinaria</i>                    |                                                         |

*Lecanographa lyncea* (Sm.) Egea & Torrente

*Lecanora achariana* A.L. Sm.

*Lecanora argentata* (Ach.) Malme

*Lecanora cf. expallens*

*Lecanora chlarotera* Nyl.

*Lecanora confusa* Almb.

*Lecanora gangaleoides* Nyl.

*Lecanora laatokaensis* (Räs.) Poelt

*Lecanora lividocinerea* Bagl.

*Lecanora marginata*

*Lecanora mediterranea*

*Lecanora muralis* (Schreb.) Rabenh. cf.

ssp. *dubyi* (Müll. Arg.) Poelt

*Lecanora ochroidea* (Ach.) Nyl.

*Lecanora polytropa* (Hoffm.) Rabenh.

*Lecanora rubicunda* Bagl.

*Lecanora rupicola* ssp. *rupicola*

*Lecanora rupicola* ssp. *sulphurata*

*Lecanora schistina* (Nyl.) Arnold

*Lecanora subcarnea* (Liljebl.) Ach.

*Lecanora sulphurea*

*Lecanora symmicta*

*Lecidea atrobrunnea*

*Lecidea erythrophaea* Flk. ex Sommerf.

*Lecidea fuscoatra* (L.) Ach.

*Lecidea lapicida* var. *pantherina*

*Lecidella asema*

*Lecidella elaeochroma*

*Lepraria*

*Lepraria incana* (L.) Ach.

*Lepraria neglecta* (Nyl.) Lettau s. str.

*Lethariella intricata*

*Lobaria amplissima*

*Lobaria pulmonaria*

*Lobaria scrobiculata*

*Lopadium disciforme* (Flot.) Vezda &

Poelt

*Macentina cf. stigonemoides* A. Orange

*Melanelia glabrata* (Lamy) Essl.

*Melanelia stygia*

*Melanelia subaurifera*

*Micarea prasina*

*Milosium graphideorum* (Nyl.) Hawksw.

*Mycobilimbia sanguineoatra* Auct.

*Neofuscelia luteonotata* (J. Steiner) Essl.

*Nephroma laevigatum*

*Ochrolechia androgyna* (Hoffm.) Arnold

*Ochrolechia pallescens*

*Ochrolechia parella*

*Ochrolechia tartarea*

*Opegrapha atra* Pers.?

*Opegrapha calcarea* Turn. ex Sm.

*Opegrapha durieui* Mont.

*Opegrapha ochrocincta* R.G. Werner

*Pannaria conoplea*

*Pannaria leucophaea* (Vahl) P.M. Jörg.

Parasite sur *Bryoria*

*Parmelia cf. saxatilis*

*Parmelia submontana*

*Parmelia sulcata*

*Parmelina quercina* (Willd.) Hale

*Peltigera collina*

*Peltigera horizontalis* (Huds.) Baumg.

*Pertusaria albescens*

*Pertusaria alpina*

*Pertusaria amara*

*Pertusaria apennina* Bagl.

*Pertusaria cf. mammosa*

*Pertusaria coccodes*

*Pertusaria excludens* Nyl.

*Pertusaria leioplaca* (Ach.) DC.

*Pertusaria pertusa*

*Pertusaria pertusa* var. *rupestris*

*Pertusaria rupicola* (Fr.) Harm.

*Pertusaria rupicola* (Fr.) Harm. var.

*coralloidea*

*Phlyctis agelaea* (Ach.) Flot.

*Physcia aipolea*

*Physconia subaquilina* (Nyl.)

*Physconia venusta* (Ach.) Poelt

*Platismatia glauca*

*Porpidia cinereoatra* (Ach.) Hertel &

Knoph

*Protoparmelia badia*

*Protoparmelia cf. oleaginea* (Harm.)

Coppins

*Protoparmelia montagnei* (Fr.)

*Pseudevernia furfuracea*

*Pyrenula chlorospila* (Nyl.) Arnold

*Pyrrhospora quercea* (Dicks.) Korb.

*Ramalina*

*Ramalina breviuscula* Nyl.

*Ramalina calicaris* (L.) Fr.

*Ramalina canariensis*

*Ramalina cribrata* De Not.

*Ramalina farinacea* (L.) Ach.

*Ramalina fastigiata* (Pers.) Ach.

*Ramalina lusitanica* Magn.

*Ramalina pusilla*

*Ramalina requienii* (De Not.) Jatta